


TROUBLES FONCTIONNELS ET DIARRHÉE AIGUE DE L'ADULTE PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

31 mai 2016 . Une diarrhée est considérée comme aiguë lorsqu'elle dure moins de 10 . En France, 99% des diarrhées aiguës de l'adulte sont bénignes.

14 mars 2017 . Le mal de ventre peut être ponctuel, de courte durée (aiguë) ou . en cas de

troubles fonctionnels du côlon, le médecin peut prescrire des laxatifs . la personne vomit du sang, a de la fièvre, de la diarrhée et vomit beaucoup ;

Les troubles gastro-entérologiques provoquent en général ballonnements, nausées, brûlures d'estomac, éructations, douleurs intestinales, diarrhées ou . La colique est une affection bénigne qui touche aussi bien le nourrisson que l'adulte. . par différents troubles du transit intestinal, la colopathie fonctionnelle est une.

Diagnostiquer et traiter une pyélonéphrite aiguë, identifier les situations nécessitant une . le diagnostic repose sur l'existence de signes fonctionnels urinaires . situations particulières (apparitions de troubles urinaires, apparition d'une grosse . parfois associées à des signes digestifs (douleurs, vomissements, diarrhées).

Diagnostiquer une diarrhée aiguë chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. . somnolence, troubles conscience, convulsions . Insuffisance rénale : Fonctionnelle.

Un homme de 32 ans consulte pour diarrhée et douleurs abdominales. Il est magasinier, n'a jamais voyagé. Il a été appendicectomisé dans l'enfance et est.

20 févr. 2013 . L'objectif de la prise en charge de la diarrhée aiguë est de prévenir une déshydratation . Chez l'adulte, les formes légères de diarrhée . fréquemment par les troubles fonctionnels intestinaux, plus rarement par les tumeurs.

Tout le monde souffre d'une diarrhée aiguë 3 à 5 fois par an en moyenne, et les . Dans le cas des troubles fonctionnels de l'intestin tel le syndrome du côlon.

DEFINITION : Diarrhée aiguë OMS : ..comme l'émission d'au moins 3 selles par jour .

Sensibilité digestive Ce sont des troubles fonctionnels intestinaux : DI,

21 avr. 2017 . Mal au ventre chez l'adulte : derrière la douleur abdominale banale, la crainte de l' . Ces troubles fonctionnels sont à évoquer en l'absence de signes qui . est généralement au second plan car la diarrhée aiguë prédomine.

Guide du parcours de soins – Maladie Rénale Chronique de l'adulte. GUIDE DU ... rénale aiguë (obstacle, toxique, insuffisance rénale fonctionnelle, etc.) ; .. urologique (troubles de la miction, globe vésical, touchers pelviens). Examens .. déshydratation (hyperthermie, diarrhée, vomissements, canicule ou forte chaleur).

Télécharger TROUBLES FONCTIONNELS ET DIARRHEE AIGUE DE L'ADULTE livre en format de fichier PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.

Maladie cœliaque de l'adulte (MCA). 1. . Diarrhée. • Définition littéraire : trouble du transit intestinal caractérisé par . des troubles fonctionnels digestifs), cause.

Trois Différences avec l'Adulte . Préciser : -Date et début clinique de chaque signe fonctionnel : fièvre. ,diarrhée,toux,dyspnée . :signes infectieux ,,troubles digestifs ,convulsions, signes . -

Mode d'installation : : diarrhée aiguë ,prolongée.

. névralgie du trijumeau et algies de la face · Céphalée aiguë et chronique chez l'adulte et l' . les affections de début brusque à leur phase aiguë (un accident vasculaire, .. Causes fonctionnelles de troubles des fonctions cognitives .. sont des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées et perte de poids) et des.

17 mai 2010 . Diarrhée chronique : Dont les origines sont plus variées. Elles peuvent être d'origine fonctionnelle (déséquilibre de la flore intestinale, allergie.

La maladie de Still de l'adulte, ou débutant à l'âge adulte, aussi appelée syndrome de . chronique juvénile), chez qui elle est aussi mieux connue. ... daires, on trouve une hypertension, des troubles du sommeil et de l'humeur, des troubles . La détérioration des articulations pouvant entraîner un handicap fonctionnel.

S'il existe une diarrhée chronique, une coloscopie doit impérativement être . montrent parfois une arthrite qui peut n'entraîner aucun trouble fonctionnel.

Découvrez TROUBLES FONCTIONNELS ET DIARRHEE AIGUE DE L'ADULTE le livre de

Edouard Begon sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.

L'existence d'une AIT au cours de diarrhées chroniques n'est pas niable, mais . grêle responsables de malabsorption par colonisation bactérienne chronique. ... un trouble fonctionnel et non dégénératif de la régulation neuro-végétative, sans .. Approche du diagnostic étiologique des diarrhées chroniques de l'adulte à.

Elle est appelée « chronique » lorsqu'elle évolue depuis plus de 4 semaines. .. parle aussi de « trouble(s) fonctionnel(s) intestinal(aux) ») au cours duquel il n'y a pas .. quantités de lactose (à l'âge adulte l'activité lactasique de la bordure en.

. fonctionnelles, intestinales notamment avec météorisme et diarrhée. . Diafuryl, Diarrhée Aiguë d'Origine Infectieuse - Cooper, 12 Gélules, 15 ans . l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans, dans le traitement de la diarrhée aiguë d'origine . L96 est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles.

Devant des vomissements de l'adulte, argumenter les principales hypothèses . de diarrhée associée, en cas de troubles de la conscience ou en cas d'impossibilité . gastro-duodénale organique ou fonctionnelle (non rare) ; . vomissements . aiguë et surrénalienne) et hypertension intracrânienne. Tableau 39.1.

La diarrhée aiguë dure en général moins de 8 à 10 jours. . 283 : Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte . 281 : Colopathie fonctionnelle .. curable (comme par exemple une cause médicamenteuse, un trouble métabolique comme une maladie coeliaque ou une intolérance au lactose).

comme chez l'adulte la dyspepsie fonctionnelle et le syn- drome de l'intestin irritable. s La diarrhée fonctionnelle évolue par poussées d'une dizaine de jours.

TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX . Il se caractérise par une douleur ou un inconfort chronique de l'abdomen, associé à des troubles du transit (constipation, diarrhée, ou association des deux), se majorant lors de . du syndrome du côlon irritable avec constipation modéré à sévère chez le patient adulte [Lire].

14 mai 2017 . (5) Les diarrhées fonctionnelles correspondent aux pathologies coliques. . donc une des causes les plus fréquentes de diarrhée chronique. Les troubles contrastent avec un état général conservé et l'absence de signe de malabsorption. . forme bien connue de colopathie fonctionnelle de l'adulte.

D'après ce même auteur, la diarrhée serait remplacée par de la constipation, et cette . 6° La fièvre est très-intense, le pouls accéléré (120 pulsations chez l'adulte), . Lorsque l'inflammation aiguë est pure, la musculature est rarement malade . attribuer les troubles fonctionnels de la muqueuse intestinale, les sécrétions.

Lorsqu'une DAC ou une douleur abdominale aiguë (ayant commencé dans les 24 heures avant la . Il existe peu de données transversales chez l'adulte et pas d'étude ... les diarrhées, sans aucun effet sur les douleurs abdominales. . DAC sont principalement liées aux troubles fonctionnels intestinaux qu'il ne faut.

Item 171 | Voyage en pays tropical, adulte et enfant : conseils avant le départ. Pathologie ... Ivresse pathologique : sur trouble de la personnalité, avec risque de délire et de dangerosité potentielle. □ On dépiste la ... Items 194 et 302 | Diarrhée aiguë et déshydratation chez . Item 229 | Colopathie fonctionnelle. Item 281.

20 mars 2015 . Quelles sont les causes de la diarrhée et de la gastroentérite ? . La majorité des diarrhées aiguës de l'adulte sont infectieuses .. Diarrhée du voyageur ou turista: fiche Conseils au voyageurs · Coprologie fonctionnelle ... intestinale et traite les troubles associés aux diarrhées (douleurs abdominales, gaz,.

Chez l'adulte (18 ans et plus). Troubles fonctionnels gastro-intestinaux, syndrome du côlon irritable : 3g de montmorillonite . La consommation chronique d'argile (pica ou géophagie) est

connue depuis le 19^{ème} siècle. . à du kaolin sont cependant utilisées pour traiter les troubles gastro-intestinaux, y compris la diarrhée.

. que d'habitude. Une diarrhée est dite aiguë lorsqu'elle évolue depuis moins de 1 semaine. .. troubles, et précise les signes fonctionnels. Les signes.

LES DIARRHÉES AIGUES DE L'ADULTE. ASPECTS . Les XIE ou diarrhées, qui peuvent être aiguës, et qui correspondent plutôt à des cas . trouble, se combattent, se mélangent, et troublent les activités fonctionnelles du Qi .. chinois contemporains, demeure souvent bien théorique sous nos latitudes, en aiguë. Pour ma.

UE6 – N°172 • Diarrhées infectieuses de l'adulte et de l'enfant. Pilly ECN . Causes fonctionnelles : colopathie fonctionnelle, fausse . TUE6-172-1 : Principales étiologies à suspecter devant une diarrhée aiguë . Troubles de la vigilance,.

Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte . Présence de rhinorrhée, conjonctivite, toux, dysphonie, myalgie, diarrhée. . TDR négatif avec dans un contexte à risque de rhumatisme articulaire aigu (RAA). .. Signes fonctionnels et généraux : ... Hypertrophie chronique responsable de troubles respiratoires (syndrome.

28 août 2017 . ITEM 216 Rétention aiguë d'urine. . ITEM 303 Diarrhée chronique. . Elle peut s'intégrer dans des troubles fonctionnels intestinaux (TFI).

diarrhée, l'infection à Campylobacter, critères souvent cités comme de mauvais pronostic chez l'adulte [2], ne le seraient pas chez l'enfant [1, 23, 24, 36]. . En cas de rechute au delà de 4 semaines, il peut s'agir d'une forme chronique de SGB. . cas de troubles respiratoires, de la déglutition ou de troubles neurovégétatifs.

13 mars 2017 . On fait le point sur les quatre types de diarrhée aiguë de l'adulte et les traitements proposés. . Les diarrhées par troubles de la motricité intestinale . diarrhée motrice due le plus souvent à une colopathie fonctionnelle ou des.

La diarrhée aiguë dure en général moins de 8 à 10 jours. Elle est précédée . En milieu occidental ou industrialisé, leur incidence (un épisode par adulte et .. intestinale) ou troubles fonctionnels hépatiques et pancréatiques ainsi que par des.

Troubles fonctionnels intestinaux (TFI) ou Syndrome de l'intestin irritable. . Suites d'une affection intestinale aiguë (gastro-entérite, amibiase). . Diarrhée : Augmentation du poids de selles/j, se traduit par des évacuations impérieuses, des selles .. Relation Médecin-Malade encore plus importante que pour l'adulte.

Diagnostics différentiels en cas de diarrhée chronique . pour différencier les causes fonctionnelles des causes organiques d'une diarrhée chronique. . L'intolérance au fructose est liée à un trouble intestinal engendrant une augmentation du.

30 oct. 2015 . Trouble de la fonction d'absorption. Physiopathologie . Diarrhée aqueuse et selles profuses en « eau de riz » . Très fréquentes et très . Chronique : parasite ou immunodéprimé . Isolé ou . Fonctionnelles : colopathie spasmodique +++++ fausses ..

Nourrisson < 6 mois +++ (enfant et adulte). Ingestion de.

Diarrhée chronique : Définition et . adulte : 14 % (douleurs). 3 % (sans douleurs). Service hosp. de recours. 20 %. 80 % .. Troubles fonctionnels intestinaux.

Elle peut s'accompagner de constipations, de diarrhées, parfois d'une transpiration . Gastro-entérite, constipation chronique. . par une somatisation (transformation d'un trouble psychique en trouble physique ou organique). . de l'intestin irritable fait partie de ce que l'on appelle les troubles digestifs fonctionnels. Il a porté.

Devant une diarrhée chronique, argumenter les principales hypothèses diagnostiques . les antécédents familiaux ou personnels de troubles fonctionnels intestinaux .. diarrhée modérée ancienne d'allure motrice chez un adulte jeune, sans.

de son absence d'effets centraux chez l'adulte et de sa fixation préférentielle au .. le marché que

pour les troubles fonctionnels intestinaux (et pas la diarrhée.

Diarrhée chronique hydro-électrolytique de l'adulte. Cours de ... Environ 15 à 20 % de la population occidentale présente des troubles fonctionnels intestinaux.

24 avr. 2015 . La possibilité de TFGI après une diarrhée aiguë infectieuse (DAI) est bien établie chez l'adulte. Après une gastroentérite bactérienne, 25 % en.

La diarrhée aiguë est un trouble fonctionnel digestif soudain, qui peut n'être que le symptôme d'une maladie plus générale, ou résumer à lui seul la maladie.

8 sept. 2016 . Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte; N° 109. . Vieillesse normale : aspects biologiques, fonctionnels et relationnels. Données .. Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte; N° 331.

Manifestations fonctionnelles et psychosomatiques. . On verra aussi des symptômes moteurs comme des troubles de l'équilibre, paralysie ou faiblesse . Les symptômes gastro-intestinaux vont plutôt être du type ballonnements, diarrhée, gastrite. . générales mal connues comme la fibromyalgie et la fatigue chronique.

Chez l'adulte, on observe des épidémies dues aux norovirus (norwalk-like virus) . La fièvre, lorsqu'elle accompagne une douleur abdominale ou des diarrhées, est . telle qu'une cholécystite aiguë, une obstruction intestinale, une pancréatite, une . ABC des gestes techniques et des tests fonctionnels en médecine interne.

Diagnostiquer une diarrhée aiguë chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. - Diagnostiquer un état de déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte.

En l'absence de douleur ou de tout autre trouble, il est conseillé d'effectuer une . nausées, ballonnements, difficultés à digérer, constipations, diarrhées. . principal est l'expression douloureuse, et provoquent une gêne fonctionnelle lors du . Elles peuvent être caractérisées par une évolution aiguë mais si l'exposition aux.

La diarrhée est une quantité de selles émises dans un volume plus important que la normale . Intoxication alimentaire : la diarrhée aiguë est le plus souvent le symptôme d'une infection du système digestif (gastro-entérite) causée .. Sa cause la plus fréquente est le Trouble Fonctionnel Intestinal (TFI), puis l'hyperthyroïdie.

15 févr. 2006 . Une diarrhée aiguë peut avoir de nombreuses causes, mais les . au lactose, syndrome du côlon irritable, trouble fonctionnel intestinal.

Cystite aiguë simple; Cystite aiguë récidivante; Pyélonéphrite aiguë (PNA) simple . la femme enceinte; Sources; A lire aussi: Infection urinaire donne la diarrhée . fonctionnels urinaires (brûlures mictionnelles, impériosité, rétention d'urine.

fonctionnels intestinaux ? Les TFI se caractérisent . l'adulte, les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) sont . diarrhée chronique non spécifique ou diarrhée.

5 juin 2015 . La diarrhée se manifeste souvent le matin ou après un repas. Ce type de diarrhée est surtout rencontré lors des troubles fonctionnels des.

La diarrhée aiguë est généralement le symptôme d'une infection .. Côlon irritable (trouble intestinal fonctionnel); Maladies inflammatoires chroniques de.

Les estimations plus quantitatives disent qu'un adulte est constipé s'il va à la selle moins de 3 fois par semaine. . Troubles du transit: constipation . Une alternance de diarrhées et de constipation signifie que les intestins forcent sur . d'alerte très importants, car ils peuvent témoigner d'une invagination intestinale aiguë .

Epidémiologie diarrhée aiguë de l'adulte. □ Fréquent: 3 millions de consultations/an . Intra cellulaire: soif, sécheresse des muqueuses, troubles de la cs.

Les examens de selles sont indiqués chez l'adulte essentiellement dans deux . a priori sans raison valable, notamment en cas de troubles fonctionnels digestifs. .. En cas de diarrhée aiguë, la prescription d'une coproculture ne sera.

Diarrhée hydrique non fébrile – persistante (> 3 jours). 1.3. Syndrome cholériforme après voyage. 1.4. DA post antibiotique. 1.5. Toxi-infection alimentaire (>= 2.

26 sept. 2017 . Traitement de la diarrhée aiguë chez l'enfant et le nourrisson en . des douleurs liées aux affections intestinales fonctionnelles chez l'adulte. 4.2. .. TNF- α (impliquée dans divers troubles intestinaux : diarrhées infectieuses,

ytiques. et troubles. rénaux. Les déséquilibres hydroélectrolytiques sont une . et celui de toute autre perte liquidienne (diarrhée, vomissements, diaphorèse). . (comme en cas de trauma aigu) ou une incontinence extra-urétrale (comme dans . Les troubles de la miction peuvent être congénitaux ou acquis à l'âge adulte.

1. TROUBLES DIGESTIFS DE L'ADULTE ... La colopathie fonctionnelle. \triangleright Douleurs abdominales ... Diarrhée aiguë : attention au risque de déshydratation.

Adulte et sénior, les troubles fonctionnels et musculo-squelettiques deviennent plus fréquents. . Ballonnements,; Constipation,; Diarrhée chronique...

3 déc. 2011 . Fréquence : diarrhée +++ = $\frac{1}{4}$ des consultations pour problèmes de . diarrhée chronique. Turista . CAT devant une diarrhée aiguë (1). Diarrhée . Troubles fonctionnels . Doses infectantes moins élevées que chez l'adulte.

En ce qui concerne les diarrhées et les autres troubles qui accélèrent le transit (intestin irritable, stress, troubles fonctionnels intestinaux) les conseils suivants.

25 janv. 2014 . Aiguë si < 5 jours / Prolongée si > 3 semaines; T > 37.5°C (le matin) .

Syndrome confusionnel : désorientation / conscience / agitation / fluctuation; Troubles de la . Vomissements / Diarrhée; Signes fonctionnels organiques.

26 juil. 2011 . Certaines maladies digestives, dont les troubles fonctionnels . Chez l'enfant ou l'adulte, une diarrhée est aiguë quand il y a émission d'au.

L'enfant présente souvent une diarrhée chronique, il est fatigué, apathique et triste. . Chez l'adulte, les signes de la maladie peuvent être la diarrhée et un . ont toutes cliniquement le tableau de « troubles fonctionnels intestinaux ».

28 mai 2017 . "Abdomen sub-aigu" : il consiste en des douleurs persistantes ou en voie de . A noter que chez l'enfant et le jeune adulte masculin, toute douleur abdominale . gargouillis abdominaux, ballonnement, constipation et/ ou diarrhée, ... Les troubles fonctionnels constituent la première cause de douleurs.

Encadré 1 Signaux d'alarme lors de diarrhée chronique ou de troubles fonctionnels intestinaux chez l'adulte. (âgé de 45 ans et plus) n. Perte pondérale n.

Adulte / Senior. Vous appréciez . Le traitement des troubles fonctionnels de l'adulte . Troubles digestifs : reflux, douleurs, constipation ou diarrhée chronique...

du grêle de l'adulte. Edouard LOUIS. Service d'Hépto- . Signes digestifs avec diarrhée chronique. Signes carences . Tableau de trouble fonctionnel intestinal.

douleurs abdominales, des vomissements et parfois une diarrhée. Ces troubles . Le tableau de l'intoxication chronique associe diversement les troubles cliniques et biologiques . Chez l'adulte, la forme typique de l'encéphalopathie aiguë nécessite une plombémie supérieure à .. d'œil, sans retentissement fonctionnel.

l'adulte, l'enfant, la femme en périnatalité, la personne âgée, soins à domicile . anormale - 1986 Thermorégulation inefficace 1986 Trouble de la déglutition - 1986, . Risque de constipation - 1988 Pseudoconstipation - 1988 Diarrhée - 1975 . 1986 Incontinence urinaire fonctionnelle - 19861998 - Incontinence urinaire par.

1 oct. 2012 . Chez l'adulte et le sujet âgé, le mécanisme causal semble en être . diarrhée, perte de poids, troubles de l'humeur faits d'inattention ou.

l'échelle DOLOPLUS est adaptée aux personnes âgées ayant des troubles . 3 Evaluation et suivi de la douleur chronique chez l'adulte en médecine .. également susceptibles de provoquer une

insuffisance rénale fonctionnelle par ... Des nausées, vomissements, diarrhées, flatulences, constipation, dyspepsie, stomatite.

Symptômes des troubles digestifs; Douleur abdominale aiguë · Douleur thoracique ou dorsale .. de nausées et de vomissements (appelés vomissements fonctionnels ou psychogènes). ..

Nausées, vomissements et diarrhées sévères.

. de l'adulte 19 Question 101 - Hémorragie digestive (et traitement d'urgence) 23 . Constipation 27 Question 103 - Diarrhée chronique 31 Question 104 - Ascite . gastrique chronique 99 Question 252 - Troubles fonctionnels intestinaux 109.

Troubles fonctionnels intestinaux et diarrhée aiguë de l'adulte: Amazon.ca: Begon: Books.

I-11-Q195. 1579. • Diagnostiquer une douleur abdominale et lombaire aiguë chez l'enfant et chez l'adulte. ... On reconnaît actuellement 5 types de troubles fonctionnels . association à une modification du transit (diarrhée ou constipation) ;

Diarrhée prolongée à chronique de début aigu. • Troubles fonctionnels intestinaux post-infectieux .. Diarrhées aiguës de l'adulte en France. Examen.

Devant une diarrhée chronique, argumenter les principales hypothèses . un terrain familial ou personnel de troubles fonctionnels intestinaux, de maladies .. une diarrhée modérée très ancienne d'allure motrice chez un adulte jeune, sans.

Enfin, une diarrhée aiguë peut être le mode de révélation d'une maladie chronique. Parmi les causes .. coléctasie aiguë. - Biologie : Hyperleucocytose parfois considérable, troubles hydro-électrolytiques. ... fonctionnels avec les shigelles.

Ce phénomène est facteur de déséquilibres et de troubles de gravité variable tels . une colopathie fonctionnelle, une diarrhée sanglante ou un cancer du côlon. ... Sous l'influence du contact chronique avec l'acide gastrique, l'épithélium de.

Actuellement la correction de ce déficit énergétique en phase aiguë reste . hypokaliémie, (hypocalcémie) qui sont responsables de troubles . Fonctionnel ? .. Ils sont préconisés pour limiter le risque de survenue de diarrhée, pour réguler le.

Tableau I. Principales causes des vomissements chroniques chez l'adulte .. Ils ont été surtout validés pour le screening de troubles du comportement alimentaire. . II de dyspepsie fonctionnelle, des vomissements alimentaires post-prandiaux .. Le traitement de la phase aiguë repose sur les antagonistes des récepteurs.

La gastro-entérite aiguë est une inflammation de la muqueuse du tube digestif responsable de diarrhée, de douleurs abdominales et vomissements.

4 oct. 2017 . La constipation chronique est un trouble fonctionnel intestinal fréquent. Les ... phénomène qui explique la diarrhée sécrétoire causée.

intestinaux (TFI) de l'adulte . De nos jours, les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) touchent environ 5 % de la . des symptômes (douleurs, difficulté à la digestion, constipation, diarrhée, ballonnement et . douleur aiguë ou chronique.

DE L'ADULTE. Dr BOUTRA . La diarrhée chronique est définie comme l'émission, pendant plus de 4 semaines .. ou tumoral et élimine en principe une cause fonctionnelle ; la . musculaire, manifestations cliniques secondaires aux troubles.


Des troubles fonctionnels, le plus souvent liés à des compressions au niveau de . maux de ventre, constipation, diarrhée chronique, problèmes de vision, maux de . pieds plats ou creux, troubles fonctionnels liés à un état dépressif. L'adulte.

La diarrhée chronique non spécifique du jeune enfant pourrait être due à des facteurs plus . Comme chez l'adulte, les troubles fonctionnels digestifs (TFD) sont.

. clinique - Troubles du transit - Constipation Diarrhée chronique - La diarrhée . 194 - Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte.

Une diarrhée est dite aiguë lorsqu'elle évolue depuis moins de 2 semaines, . une

polyexonération liée à un syndrome dyschésique et/ou à un trouble de la.

A small, illegible table or list of text located in the top left corner of the page. It appears to be a list of items with corresponding numerical values or identifiers, but the text is too small to read.